AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-5-72 311686

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE" TÉL. RENNES (99) 36-01-74

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux, Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 139 — 27 AVRIL 1972

POIRIER - POMMIER

TAVELURE : Il convient de demeurer vigilant, les risques de contamination étant très importants du fait du rapide accroissement des surfaces foliaires (essentiellement sur poirier) et du grand nombre d'ascospores susceptibles d'être libérées.

Le renouvellement de la protection doit s'effectuer en fonction de ces données mais aussi en tenant compte des pluies tombées depuis le dernier traitement (se reférer, à ce sujet, au bulletin du 18 avril).

ACARIENS (araignées rouges) - Plus de 50 % des oeufs d'hiver sont actuellement éclos dans certains vergers n'ayant pas reçu de traitement ovicide. Ailleurs, l'éclosion débute seulement.

En conséquence, un traitement ne se justifie actuellement que dans les vergers n'ayant pas reçu de traitement d'hiver. Pour les autres, attendre un nouvel avis.

Sur les arbres en fleurs, utiliser un acaricide non dangereux pour les abeilles. La préférence devra être accordée aux produits actifs sur les différentes formes d'acariens (oeufs, larves, adultes).

Compte-tenu de ces exigences, nous conseillons l'un des produits suivants :

- Dicofol (Kelthane, Sovifol). Ce produit s'est révélé récemment insuffisant dans certains vergers où il était très efficace au début de son emploi.
- Dicofol + Tetradifon (Kelthion)
- Hydroxyde de Tricyclohexyl Etain (Plictran). Ce produit a une longue persistance d'action.
- Tetradifon (Tédion emulsion)
- Tetrasul (Animert V 101). Action lente mais prolongée, particulièrement efficace sur oeufs d'hiver.

PUCERONS - Les indications contenues dans notre précédent bulletin restent valables. Intensifier la surveillance dès le prochain réchauffement de la température.

RHYNCHITES COUPE-BOURGEONS - Ces petits charançons sectionnent les jeunes pousses. Ils occasionnent ainsi des dégâts parfois sensibles dans les pépinières et les jeunes plantations, principalement sur poiriers.

Là où ils se manifestent habituellement, prévoir un traitement dès le début du développement des pousses avec du Lindane, à la dose de 12 g/hl.

.../...

P. 393

Imprimerie de la Station de Rennes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

GUEPES - Le piégeage devra être réalisé dès la hausse des températures, dans les vergers où des dégâts ont été causés aux fruits au cours de l'été dernier.

Il est indispensable d'intervenir à cette période pour détruire les fondatrices.

Les bouteilles servant de pièges (10 à 15 par ha) doivent être remplies aux 3/4 d'un liquide attractif (bière ou cidre) qu'il faut renouveler assez souvent pour maintenir une efficacité suffisante.

Ne pas employer un mélange d'eau et de miel afin d'épargner les abeilles.

FRAISIER

PUCERONS ET ACARIENS (araignées jaunes)

Le développement de ces ravageurs est à craindre actuellement, principalement sous tunnels et autres abris. Sur fraisiers en fleurs, seuls le Diéthion (Rhodocide, Kilspide) et la Phosalone (Azofène, Dynalone, Zolone) sont à la fois efficaces contre ces deux ennemis et non dangereux pour les abeilles.

En dehors de la floraison, utiliser de préférence :

- contre pucerons : Mévinphos (nombreuses spécialités commerciales) autorisé jusqu'à 7 jours de la récolte.
- contre acariens : Dicofol (Kelthane, Sovifol) autorisé jusqu'à 15 jours de la récolte.

Sous abris, effectuer les traitements de préférence dans la soirée, afin d'éviter d'éventuelles brûlures consécutives à une élévation de la température.

POMME DE TERRE DE PRIMEUR

MILDIOU - Quelques taches ont été observées mais les conditions climatiques sont actuellement peu favorables à cette maladie. Attendre un nouvel avis.

CHOUX

ALTISES - Des attaques de ces petits insectes sont à craindre dans les pépinières de semis dès cette époque. Si leur présence était constatée, traiter avec l'un des produits indiqués dans le bulletin spécial n° 139, au chapitre colza.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

G. PAITIER et C. CHARPENTIER

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription
Phytosanitaire "Bretagne"

J. DELOUSTAL

Dernière note : Supplément n° 1 au bulletin n° 139 du 18 avril 1972